

## **Trommelvliesbuisjes en/of verwijderen van poliepen**

### **Inleiding**

Je kind zal een ingreep ondergaan aan één of beide oren omwille van herhaalde oorontstekingen of omwille van verminderd gehoor. Hiervoor worden trommelvliesbuisjes geplaatst in één of beide oren. Via een insnede van enkele millimeters in het trommelvlies wordt eerst het vocht afgezogen. Aansluitend wordt in deze insnede het buisje geplaatst zodat er via dit buisje opnieuw lucht in het middenoor kan.

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het heelkundig dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is. Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinderafdeling jullie halen.

Eens op de kamer raden de artsen aan te wachten met drinken en eten tot je kind terug thuis is, dit om complicaties (zoals braken) te voorkomen.

### **Pijnbeleid**

Bij pijn mag je je kind zo nodig een pijnstiller geven, maximaal elke 6 uur te herhalen (Perdolan/Dafalgan of Nurofen/Perdophen). Aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden aangezien dit nabloeding kan bevorderen.

## **Trommelvliesbuisjes en/of verwijderen van poliepen**

### **Inleiding**

Je kind zal een ingreep ondergaan aan één of beide oren omwille van herhaalde oorontstekingen of omwille van verminderd gehoor. Hiervoor worden trommelvliesbuisjes geplaatst in één of beide oren. Via een insnede van enkele millimeters in het trommelvlies wordt eerst het vocht afgezogen. Aansluitend wordt in deze insnede het buisje geplaatst zodat er via dit buisje opnieuw lucht in het middenoor kan.

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het heelkundig dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is. Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinderafdeling jullie halen.

Eens op de kamer raden de artsen aan te wachten met drinken en eten tot je kind terug thuis is, dit om complicaties (zoals braken) te voorkomen.

### **Pijnbeleid**

Bij pijn mag je je kind zo nodig een pijnstiller geven, maximaal elke 6 uur te herhalen (Perdolan/Dafalgan of Nurofen/Perdophen). Aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden aangezien dit nabloeding kan bevorderen.



## Tips voor thuis

- Gedurende de eerste dagen kan er nog wat vocht uit het oor lopen. Indien dit langer dan 1 week duurt of indien het vocht etterig is of slecht ruikt, dien je met ons of met je huisarts contact op te nemen.
- Je kind kan het hoofd best niet onder water houden, dit kan infectie of oorloop veroorzaken.
- Douchen of kort de haren wassen is toegestaan.
- Zwemmen is de eerste 3 weken te vermijden.
- De buisjes worden op langere termijn spontaan afgestoten; dit is pijnloos en het buisje is zo klein dat je het meestal niet vindt.
- Bij thuiskomst mag jouw kind wat drinken (liefst starten met een kleine hoeveelheid en iets licht: een flesje drank zonder bruis zoals water of appelsap). Als dit probleemloos gaat, mag je kind iets licht verteerbaar eten. Nadien mag normaal gegeten worden. De eerste dagen eet je kind best geen warme gerechten.

Meestal worden de vegetaties (poliepen) tegelijkertijd verwijderd. Dit geeft zelden aanleiding tot pijn. Nabloedingen zijn eveneens zeldzaam, doch is het raadzaam om je kind de eerste dagen wat rustig te houden. Neem contact op met de kinderafdeling of spoedgevallen in geval van een nabloeding.

Een controleonderzoek op de raadpleging is gepland. Indien u hiervoor nog geen afspraak heeft, gelieve één te maken op het nummer 011 69 95 22.

**Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op het nummer 011 69 95 22, op de dienst spoedgevallen 011 69 93 33 of op de kinderafdeling 011 69 97 90.**



## Tips voor thuis

- Gedurende de eerste dagen kan er nog wat vocht uit het oor lopen. Indien dit langer dan 1 week duurt of indien het vocht etterig is of slecht ruikt, dien je met ons of met je huisarts contact op te nemen.
- Je kind kan het hoofd best niet onder water houden, dit kan infectie of oorloop veroorzaken.
- Douchen of kort de haren wassen is toegestaan.
- Zwemmen is de eerste 3 weken te vermijden.
- De buisjes worden op langere termijn spontaan afgestoten; dit is pijnloos en het buisje is zo klein dat je het meestal niet vindt.
- Bij thuiskomst mag jouw kind wat drinken (liefst starten met een kleine hoeveelheid en iets licht: een flesje drank zonder bruis zoals water of appelsap). Als dit probleemloos gaat, mag je kind iets licht verteerbaar eten. Nadien mag normaal gegeten worden. De eerste dagen eet je kind best geen warme gerechten.

Meestal worden de vegetaties (poliepen) tegelijkertijd verwijderd. Dit geeft zelden aanleiding tot pijn. Nabloedingen zijn eveneens zeldzaam, doch is het raadzaam om je kind de eerste dagen wat rustig te houden. Neem contact op met de kinderafdeling of spoedgevallen in geval van een nabloeding.

Een controleonderzoek op de raadpleging is gepland. Indien u hiervoor nog geen afspraak heeft, gelieve één te maken op het nummer 011 69 95 22.

**Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op het nummer 011 69 95 22, op de dienst spoedgevallen 011 69 93 33 of op de kinderafdeling 011 69 97 90.**