


## CT-onderzoek van de buik- en bekkenorganen

---



### Wat is het?

Het is een computer tomografie (CT) van de buikholte. Er worden axiale doorsnedes gemaakt vanaf het middenrif t.e.m. de onderzijde van het bekken. Afhankelijk van de vraag van de verwijzende arts en de klinische indicatie kan gebruik gemaakt worden van IV-, perorale- en rectale toediening van contraststof. Dit wordt bepaald door de radioloog. Het onderzoek duurt 20 min. Na het onderzoek kunnen 3D-reconstructies gemaakt worden op een werkstation.

### Vorbereiding

Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn.

Het onderzoek vereist ook een langere voorbereiding: vooraleer u in de onderzoekszaal geroepen wordt, vraagt men u om gespreid over 1 uur een bepaalde hoeveelheid water te drinken. Hierin is een contrastvloeistof gemengd die de organen beter zichtbaar maakt op de röntgenfoto's. Daarna begeleidt de radiologisch verpleegkundige u naar de onderzoekszaal.

Indien nodig zal de verpleegkundige u een klein lavement met contrastvloeistof toedienen. Wanneer de arts dit nodig acht, zal de verpleegkundige u tijdens het onderzoek contrastvloeistof toedienen via een inspuiting in een ader van de arm.

Het onderzoek is niet pijnlijk. Indien een contrastmiddel wordt ingespoten, zult u een prik voelen zoals bij een bloedafname. Het product geeft een warmtegevoel over heel het lichaam, vooral ter hoogte van de keel en de onderbuik. Dit gevoel verdwijnt na een minuut en hoeft u niet te verontrusten.

### Nazorg

Om de contraststof zo snel mogelijk te verwijderen, raden we u aan na het onderzoek voldoende te drinken.