


DMSA-scan

PATIËNTENINFORMATIE



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

t 011 69 91 11 • f 011 69 91 10
info@stzh.be • www.sint-trudo.be



Welkom

Welkom op de dienst nucleaire geneeskunde. In deze brochure kunt u meer informatie vinden over de DMSA-scan die op onze dienst uitgevoerd wordt.

Wat is een DMSA-scan?

Een DMSA-scan wordt gebruikt om de werking van de nieren te beoordelen. Op deze manier kunnen eventuele afwijkingen van de nieren opgespoord worden.

Verloop van het onderzoek

Ter voorbereiding van het onderzoek wordt bij uw kind een infuus geprikt.

Het onderzoek vindt plaats op de dienst nucleaire geneeskunde. Een verpleegkundige begeleidt u en uw kind. Uw kind wordt op de onderzoekstafel gelegd. Via een infuus wordt een radioactieve stof toegediend. Vervolgens wordt een scan van 5 min. genomen. Hierna kunnen u en uw kind naar huis (in geval van kort verblijf) of terug naar de kamer (in geval van hospitalisatie).

Op de dienst nucleaire geneeskunde wordt gezegd hoe laat u en uw kind moeten terugkomen voor de controlescan. De wachttijd is normaal 4 tot 6 uur. Indien uw kind is opgenomen, komt de verpleegkundige u en uw kind opnieuw halen.

Zo nodig wordt nu rectaal een medicament toegediend waardoor uw kind slaperig wordt.

Na afloop worden de onderzoeksresultaten naar de kinderarts gestuurd. Hij/zij zal de resultaten met u bespreken.

Duur van het onderzoek

De controlescan duurt 3 maal 5 minuten. Het is belangrijk dat uw kind tijdens de hele scan stil blijft liggen. Nadien wordt een scan genomen van 1 minuut van het insteekpunt van het infuus. Hierna is het onderzoek afgelopen en kunnen u en uw kind naar huis of terug naar de kamer.

Voorzorgsmaatregelen

Aangezien uw kind werd ingespoten met een radioactieve vloeistof moet u een aantal richtlijnen volgen:

- Indien u zwanger bent, of vermoedt dat u zwanger bent, verwittig dan onmiddellijk de arts voor de start van het onderzoek.
- Wees voorzichtig met het verwisselen van de luier op de dag van het onderzoek.

Nevenwerkingen

Uw kind zal van de inname geen noemenswaardige hinder ondervinden. Allergische reacties komen uiterst zelden voor en alleen in zeer lichte mate. Er bestaat een kleine kans op een bloeditstorting door het aanprikken van een bloedvat, maar deze verdwijnt vanzelf na een paar dagen.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, neem gerust contact op met de dienst nucleaire geneeskunde.

U kunt ons bereiken op tel. 011 69 93 00.