

Verwijderen van (keel)amandelen

Inleiding

Omwille van aanslepende infecties zal je kind een ingreep ondergaan waarbij de beide amandelen worden verwijderd. Dit gebeurt langs de mond via een kleine insnede. Na het verwijderen worden alle bloedingen die hierbij optreden zorgvuldig toegebrand.

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het heelkundig dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is. Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinderafdeling jullie halen.

Eens op de kamer mag je kind na twee uur water drinken. Dit zonder een rietje aangezien het zuigen een bloeding kan uitlokken. Als dit goed gaat, mag hij/zij een ijsje of een yoghurt/pudding/petit gervais eten.

Pijnbeleid

Bij pijn mogen pijnstillers gegeven worden. De eerste dagen bij voorkeur systematisch alle 4 uur (ook `s nachts), d.w.z. Perdolan/Dafalgan afgewisseld met Perdophen/Nurofen. Aspirine (aspegic, aspro) of aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden aangezien deze nabloedingen kunnen veroorzaken

Tips voor thuis

- Het is mogelijk dat je kind vandaag nog licht bloederig speeksel opgeeft. Een echte nabloeding (meer en helrood bloed) is zeldzaam.

Verwijderen van (keel)amandelen

Inleiding

Omwille van aanslepende infecties zal je kind een ingreep ondergaan waarbij de beide amandelen worden verwijderd. Dit gebeurt langs de mond via een kleine insnede. Na het verwijderen worden alle bloedingen die hierbij optreden zorgvuldig toegebrand.

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het heelkundig dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is. Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinderafdeling jullie halen.

Eens op de kamer mag je kind na twee uur water drinken. Dit zonder een rietje aangezien het zuigen een bloeding kan uitlokken. Als dit goed gaat, mag hij/zij een ijsje of een yoghurt/pudding/petit gervais eten.

Pijnbeleid

Bij pijn mogen pijnstillers gegeven worden. De eerste dagen bij voorkeur systematisch alle 4 uur (ook `s nachts), d.w.z. Perdolan/Dafalgan afgewisseld met Perdophen/Nurofen. Aspirine (aspegic, aspro) of aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden aangezien deze nabloedingen kunnen veroorzaken

Tips voor thuis

- Het is mogelijk dat je kind vandaag nog licht bloederig speeksel opgeeft. Een echte nabloeding (meer en helrood bloed) is zeldzaam.



- Het is normaal dat je kind de volgende dagen keel- en slikpijn heeft en voedsel en/of drank moeilijk inneemt. De wonde in de keel geneest na de veelvuldige infecties immers langzaam (7 à 10 dagen). Meestal is de pijn erger na 4 à 5 dagen, dit is geen alarmteken.
- Wat voeding betreft worden vooral melkproducten (yoghurt, platte kaas) goed verdragen. Liefst niet te warme spijsen of dranken. Ook chocolade, fruitsap of bruisende dranken veroorzaken meer slikpijn. Als je je kind de eerste dagen 's nachts wakker maakt om pijnstilling te geven, laat je hem/haar best ook wat drinken om uitdroging van de wonde (wat zorgt voor pijn) te voorkomen.
- Vanaf de 2de dag mag je malse spijsen geven zoals mals brood, puree, macaroni, spaghetti, cake, pannenkoeken.
- Na enkele dagen kan er zich een wit-geelachtig beslag vormen op de plaats van de wonde in de keel. Dit is normaal en wordt soms verkeerdelijk aanzien als een infectie. Een antibioticum is dan ook niet nodig. Dit beslag kan echter wel een wat onaangename mondgeur veroorzaken. Na ongeveer 10 dagen wordt dit beslag afgestoten.
- Je kind kan de eerste dag na de operatie een licht verhoogde temperatuur vertonen. Indien dit aanhoudt of erger wordt, kun je je huisarts raadplegen.
- Na ongeveer 4 weken is een controleonderzoek op de raadpleging gepland. Gelieve hiervoor een afspraak te maken op het nummer 011 67 32 01.

Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op het nummer 011 67 32 01, op de dienst spoedgevallen 011 69 93 33 of op de kinderafdeling 011 69 97 90.



- Het is normaal dat je kind de volgende dagen keel- en slikpijn heeft en voedsel en/of drank moeilijk inneemt. De wonde in de keel geneest na de veelvuldige infecties immers langzaam (7 à 10 dagen). Meestal is de pijn erger na 4 à 5 dagen, dit is geen alarmteken.
- Wat voeding betreft worden vooral melkproducten (yoghurt, platte kaas) goed verdragen. Liefst niet te warme spijsen of dranken. Ook chocolade, fruitsap of bruisende dranken veroorzaken meer slikpijn. Als je je kind de eerste dagen 's nachts wakker maakt om pijnstilling te geven, laat je hem/haar best ook wat drinken om uitdroging van de wonde (wat zorgt voor pijn) te voorkomen.
- Vanaf de 2de dag mag je malse spijsen geven zoals mals brood, puree, macaroni, spaghetti, cake, pannenkoeken.
- Na enkele dagen kan er zich een wit-geelachtig beslag vormen op de plaats van de wonde in de keel. Dit is normaal en wordt soms verkeerdelijk aanzien als een infectie. Een antibioticum is dan ook niet nodig. Dit beslag kan echter wel een wat onaangename mondgeur veroorzaken. Na ongeveer 10 dagen wordt dit beslag afgestoten.
- Je kind kan de eerste dag na de operatie een licht verhoogde temperatuur vertonen. Indien dit aanhoudt of erger wordt, kun je je huisarts raadplegen.
- Na ongeveer 4 weken is een controleonderzoek op de raadpleging gepland. Gelieve hiervoor een afspraak te maken op het nummer 011 67 32 01.

Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op het nummer 011 67 32 01, op de dienst spoedgevallen 011 69 93 33 of op de kinderafdeling 011 69 97 90.