

Trommelvliesbuisjes en/of verwijderen van poliepen

Inleiding

Je kind zal een ingreep ondergaan aan één of beide oren omwille van herhaalde oorontstekingen of omwille van verminderd gehoor. Hiervoor worden trommelvliesbuisjes geplaatst in één of beide oren. Via een insnede van enkele millimeters in het trommelvlies wordt eerst het vocht afgezogen. Aansluitend wordt in deze insnede het buisje geplaatst zodat er via dit buisje opnieuw lucht in het middenoor kan.

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het heelkundig dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is. Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinderafdeling jullie halen.

Eens op de kamer raden de artsen aan te wachten met drinken en eten tot je kind terug thuis is, dit om complicaties (zoals braken) te voorkomen.

Pijnbeleid

Bij pijn mag je je kind een pijnstiller geven, maximaal elke 6 uur te herhalen (Perdolan/Dafalgan of Nurofen/Perdophen).

Aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden aangezien dit nabloeding kan bevorderen.

Trommelvliesbuisjes en/of verwijderen van poliepen

Inleiding

Je kind zal een ingreep ondergaan aan één of beide oren omwille van herhaalde oorontstekingen of omwille van verminderd gehoor. Hiervoor worden trommelvliesbuisjes geplaatst in één of beide oren. Via een insnede van enkele millimeters in het trommelvlies wordt eerst het vocht afgezogen. Aansluitend wordt in deze insnede het buisje geplaatst zodat er via dit buisje opnieuw lucht in het middenoor kan.

Om je kind maximaal gerust te stellen, mag je het begeleiden tot in het operatiekwartier. Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het heelkundig dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is. Wanneer je kind ontwaakt, mag je het terug bijstaan. Zodra je kind goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinderafdeling jullie halen.

Eens op de kamer raden de artsen aan te wachten met drinken en eten tot je kind terug thuis is, dit om complicaties (zoals braken) te voorkomen.

Pijnbeleid

Bij pijn mag je je kind een pijnstiller geven, maximaal elke 6 uur te herhalen (Perdolan/Dafalgan of Nurofen/Perdophen).

Aspirinehoudende pijnstillers zijn verboden aangezien dit nabloeding kan bevorderen.



Tips voor thuis

- Je kind kan het hoofd best niet onder water houden, dit kan infectie of oorloop veroorzaken.
- Douchen of kort de haren wassen is toegestaan.
- Zwemmen is de eerste 4 weken te vermijden. Daarna is het wel toegestaan indien een strakke badmuts over de oren gedragen wordt.
- De buisjes worden op langere termijn spontaan afgestoten; dit is pijnloos en het buisje is zo klein dat je het meestal niet vindt.
- Bij thuiskomst mag je kind wat drinken (liefst starten met een kleine hoeveelheid en iets licht: een flesje drank zonder bruis zoals water of appelsap). Als dit probleemloos gaat, mag je kind iets licht verteerbaar eten. Nadien mag normaal gegeten worden. De eerste dagen eet je kind best geen te warme gerechten.

Meestal worden de vegetaties (poliepen) tegelijkertijd verwijderd. Dit geeft zelden aanleiding tot pijn. Nabloedingen zijn eveneens zeldzaam, doch is het raadzaam om je kind de eerste dagen wat rustig te houden. Neem contact op met de kinderafdeling of spoedgevallen in geval van een nabloeding.

Na ongeveer 4 weken is een controleonderzoek op de raadpleging gepland. Indien u hiervoor nog geen afspraak heeft, gelieve hiervoor één te maken op het nummer 011 67 32 01.

Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op het nummer 011 67 32 01 of op de dienst spoedgevallen 011 69 93 33 of op de kinderafdeling 011 69 97 90.



Tips voor thuis

- Je kind kan het hoofd best niet onder water houden, dit kan infectie of oorloop veroorzaken.
- Douchen of kort de haren wassen is toegestaan.
- Zwemmen is de eerste 4 weken te vermijden. Daarna is het wel toegestaan indien een strakke badmuts over de oren gedragen wordt.
- De buisjes worden op langere termijn spontaan afgestoten; dit is pijnloos en het buisje is zo klein dat je het meestal niet vindt.
- Bij thuiskomst mag je kind wat drinken (liefst starten met een kleine hoeveelheid en iets licht: een flesje drank zonder bruis zoals water of appelsap). Als dit probleemloos gaat, mag je kind iets licht verteerbaar eten. Nadien mag normaal gegeten worden. De eerste dagen eet je kind best geen te warme gerechten.

Meestal worden de vegetaties (poliepen) tegelijkertijd verwijderd. Dit geeft zelden aanleiding tot pijn. Nabloedingen zijn eveneens zeldzaam, doch is het raadzaam om je kind de eerste dagen wat rustig te houden. Neem contact op met de kinderafdeling of spoedgevallen in geval van een nabloeding.

Na ongeveer 4 weken is een controleonderzoek op de raadpleging gepland. Indien u hiervoor nog geen afspraak heeft, gelieve hiervoor één te maken op het nummer 011 67 32 01.

Bij verdere vragen of problemen kun je steeds terecht op het nummer 011 67 32 01 of op de dienst spoedgevallen 011 69 93 33 of op de kinderafdeling 011 69 97 90.