

RX IVP



Onderzoek

IVP staat voor Intra-Veneuze Pyelografie en het is een onderzoek van de nieren en de urinewegen na IV-toediening van contraststof. Dit onderzoek wordt hoofdzakelijk gebruikt om nier- en ureterstenen of afvloeihinder op te sporen. Ook het evalueren van de nierfunctie, het opsporen van ruimte innemende processen en het controleren op infecties behoren tot de indicaties.

Vorbereiding

U moet 4 uur vóór het onderzoek nuchter zijn.
U krijgt de dag voordien restenarme voeding en prepacol toegediend. Eventueel krijgt u de dag van het onderzoek nog een lavement, dit om storende darmgassen te verminderen.

Verloop

U neemt plaats op een tafel. De verpleegkundige plaatst een infuus waarlangs het contrast zal toegediend worden. De contrastvloeistof wordt ingespoten. Dit kan een licht warmtegevoel veroorzaken dat na enkele seconden opnieuw verdwijnt.
Het is belangrijk om te melden indien u allergisch bent voor bepaalde contrasten. Ook astma of een allergie aan bepaalde voedingsmiddelen moet u melden aan de verpleegkundige. Vervolgens worden foto's genomen op bepaalde tijdsintervallen. De kleuring van de nieren, de nierkelken en de afloop van de blaas (zowel links als rechts) moeten in beeld gebracht worden.
Er zal ook een opname gebeuren vóór en na lediging van de blaas.
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Nazorg

We raden u aan om voldoende te drinken - enkel indien dit medisch verantwoord is - zodat de contraststof vlot verwijderd kan worden.