

Spoed



Kalinox op spoed

01 Wat?

Kalinox is een gas dat bestaat uit zuurstof en stikstof. Het zorgt ervoor dat kinderen zich rustiger voelen en minder pijn ervaren. Het kind blijft bij bewustzijn waardoor communicatie nog mogelijk is. Deze procedure wordt enkel uitgevoerd met toestemming van de ouders.

02 Doel

Het doel van Kalinox is pijn en angst te verminderen bij korte pijnlijke of onaangename ingrepen of onderzoeken zoals een infuus prikken, een bloedafname of een hechting. Hierdoor kan angst voorkomen worden en wordt de ervaring minder onaangenaam.

03 Doelgroep

Kalinox wordt enkel toegediend op medisch voorschrift bij kinderen vanaf vier jaar. Op doktersadvies kan dit ook bij kinderen vanaf 2 jaar. Nuchter zijn is niet nodig.

04

Wanneer geen Kalinox gebruiken?

Bij een zeer angstige, niet meewerkende patiënt of bij procedures langer dan 50 minuten wordt Kalinox afgeraden. In dergelijke gevallen gaat de positieve werking van Kalinox verloren.

Bij kinderen met een gelaatstrauma, neurotrauma met bewustzijnsstoornissen, gas- of vocht-ophopingen in lichaamsholtes en bij gebruik van opiaten of psychofarmaca mag Kalinox niet toegepast worden.

05

Procedure

De verpleegkundige en/of de spoedarts voert de procedure uit. Het kind ademt gedurende 3 minuten Kalinox in via een masker met een ballon. Hierna is het gas voldoende ingewerkt en wordt de procedure gestart. Tijdens de procedure wordt de toediening voortgezet. Er wordt ook een sensor op de teen of de vinger van het kind geplaatst om de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed te controleren.

Tijdens de procedure kan het kind filmpjes bekijken op een televisie. Wanneer de procedure afgelopen is, worden het masker en de sensor weggenomen.

De effecten van het gas verdwijnen na enkele minuten. Het kind wordt vlak na de procedure best even ondersteund zodat hij/zij niet valt. Zodra de effecten verdwenen zijn, mogen de dagelijkse activiteiten hervat worden.

Het kind kan zich tijdens het inademen van Kalinox anders gaan gedragen: vrolijk zijn, lachen, 'dronken' lijken, suf of slaperig zijn,...

Onaangename bijwerkingen komen zelden voor, maar kunnen de volgende situaties omvatten: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid. Wanneer deze bijwerkingen optreden, verdwijnen ze meestal kort na het stoppen van het gas.

07

Aanwezigheid ouders

Ouders mogen aanwezig zijn tijdens de procedure als zij dit wensen. Zij mogen tijdens de procedure met hun kind praten en hem/haar afleiden. Ondanks de effecten van Kalinox blijft het kind bewust en aanspreekbaar.

In geval van zwangerschap wordt afgeraden om de ruimte te betreden.





Vragen?

Spreek de verpleegkundige of arts zeker aan indien je hierover vragen hebt.



Diestersteeweg 100 • 3800 Sint-Truiden

t 011 69 91 11 • f 011 69 91 10

info@stzh.be • www.sint-trudo.be