

Anesthesie



Anesthesie lors d'un examen médical

Brochure d'information

Cher patient,
Chère patiente,

Par le biais de cette brochure d'information, nous aimerions vous fournir plus de détails concernant l'administration d'une anesthésie (sédation) lors d'un examen médical.

01

Déroulement de la sédation pendant l'examen

Vous allez bientôt subir un examen (par exemple, une coloscopie ou une gastroscopie). Pour votre confort, une sédation peut être administrée. Cela réduit votre niveau de conscience, rendant l'examen plus agréable.

Un anesthésiste vous administrera la sédation (par exemple, du propofol) par le biais d'une perfusion. Vous vous endormirez rapidement et ne percevrez que très peu, voire rien, de l'examen. Contrairement à une anesthésie générale, le sommeil provoqué par une sédation est moins profond. Votre état clinique sera surveillé de près pendant toute la durée de l'examen. Après l'examen, vous vous réveillerez rapidement.

- Vous devez remplir la fiche de sédation préparatoire avant votre examen. Mentionnez-y des informations importantes comme les allergies, les médicaments, les antécédents médicaux, et la présence éventuelle de stimulateurs, pacemaker/DAI ou pompes implantées. Si vous avez un neurostimulateur, n'oubliez pas d'emporter l'appareil de contrôle.
- Suivez les autres instructions de préparation fournies par les collègues de médecine interne. Cela comprend les directives pour la préparation intestinale et les consignes concernant l'alimentation (à jeun à partir de minuit) et la boisson (arrêter 2 heures avant l'admission).
- Dans la salle de préparation, vous devrez enlever vos bagues, bijoux, piercings, prothèses dentaires, lunettes, lentilles de contact et appareils auditifs.

Les techniques de sédation actuelles sont généralement sûres, mais toute intervention médicale comporte des risques et des complications possibles. Lors d'une sédation, les mêmes complications peuvent survenir que lors d'une anesthésie générale.

De petits effets indésirables, tels qu'un hématome ou une inflammation au site de la perfusion, peuvent apparaître.

Des complications plus rares incluent une pneumonie ou une éraflure sur la cornée de l'œil.

Des complications graves et permanentes, telles que des lésions nerveuses ou oculaires, un choc, une défaillance d'organe ou un décès, sont extrêmement rares.

04 Soins post-sédation

- Après un examen sous sédation, vous devez être accompagné chez vous. Vous ne pouvez pas conduire (voiture, cyclomoteur, vélo), utiliser des machines ou prendre des décisions importantes pendant les 24 heures suivant l'intervention.
- Problèmes médicaux après la sédation?
 - Présentez-vous aux urgences (tél. : 011 69 93 33) ou
 - Contactez le secrétariat d'anesthésie (tél.: 011 69 94 20).

05 Coût

Les tarifs de l'anesthésie et leur remboursement sont régis par une convention avec l'INAMI (Institut national d'assurance maladie-invalidité) pour les interventions couvertes.

Pour plus d'informations sur le coût, vous pouvez contacter le service de facturation (tél. : 011 69 92 22).

La plupart des assurances hospitalisation remboursent les suppléments d'honoraires, mais certains médicaments ne sont pas remboursés et seront facturés séparément. Contactez votre assurance hospitalisation pour plus d'informations.



Questions?

Si, après avoir lu cette brochure, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser à l'anesthésiste ou à prendre rendez-vous pour une consultation d'information. Veuillez noter que le rendez-vous doit être fixé au moins une semaine à l'avance.

pré-admission
tel : 011 69 91 15



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Suivez-nous sur   