

Anesthesie



Verdoxing tijdens een medisch onderzoek

Informatiefolder

Beste patiënt

Via deze informatiefolder geven we graag wat meer informatie over het toedienen van een verdooving (sedatie) tijdens een medisch onderzoek.

01

Verloop van de verdooving tijdens het onderzoek

Je ondergaat binnenkort een onderzoek (vb. darm- of maagonderzoek). Voor je comfort kan hierbij een verdooving worden toegediend. Dit verlaagt je bewustzijn, waardoor het onderzoek aangenamer is.

Via een infuus dient de anesthesist de verdooving (vb. propofol) toe. Je valt snel in slaap en zal weinig tot niets merken van het onderzoek. In tegenstelling tot een algemene narcose is de slaap bij een sedatie minder diep. Jouw klinische toestand wordt gedurende het onderzoek nauwlettend opgevolgd. Na het onderzoek word je snel weer wakker.

02

Vorbereiding

- Je moet de voorbereidende sedatieve voor je onderzoek invullen. Vermeld hierin belangrijke zaken zoals allergieën, medicatie, medische voorgeschiedenis en eventuele aanwezigheid van stimulators, pacemaker/ICD of geïmplanteerde pompen. Als je een neurostimulator hebt, neem dan het bedieningsapparaat mee.
- Volg de verdere voorbereiding zoals aangegeven door de collega's van inwendige geneeskunde. Dit omvat richtlijnen voor de darmvorbereiding en afspraken over eten (nuchter vanaf middernacht) en drinken (stoppen 2 uur voor opname).
- In de voorbereidingsruimte moet je ringen, sieraden, piercings, vals gebit, bril, contactlenzen en hoorapparaten uitdoen.

Hedendaagse sedatietechnieken zijn over het algemeen veilig, maar elke medische ingreep brengt mogelijke risico's en complicaties met zich mee. Bij sedatie kunnen dezelfde complicaties optreden als bij een algemene narcose.

Kleine ongewenste effecten zoals een blauwe plek of ontsteking op de infuusplaats kunnen voorkomen.

Zeldzamere complicaties zijn longontsteking of een krasje op het hoornvlies van het oog.

Ernstige en blijvende complicaties zoals zenuw- of oogbeschadiging, shock, orgaanfalen of overlijden zijn zeer zeldzaam.

04

Nazorg

- Na een onderzoek onder sedatie moet je thuis begeleid worden. Je mag de eerste 24 uur na de ingreep niet zelf een voertuig besturen (auto, bromfiets, fiets), machines bedienen of belangrijke beslissingen nemen.
- Medische problemen na de verdoving?
 - Meld je aan via spoed (tel.: 011 69 93 33) of
 - Neem contact op met secretariaat anesthesie (tel.: 011 69 94 20).

05

Kostprijs

De tarieven voor anesthesie en de terugbetaling ervan worden geregeld via een overeenkomst met het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) voor ingrepen die hiervoor gedekt zijn.

Voor meer informatie over de kostprijs kan je terecht bij de dienst facturatie (tel.: 011 69 92 22).

De meeste hospitalisatieverzekeringen vergoeden de ereloonsupplementen, maar sommige medicatie wordt niet terugbetaald en wordt apart aangerekend.

Neem contact op met je hospitalisatieverzekering voor meer informatie.



Vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan de anesthesist, maak een afspraak voor een informatieve raadpleging. Let wel, de afspraak dient minstens 1 week op voorhand plaats te vinden.

vooropname
tel.: 011 69 91 15



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   